

Zestawienie najważniejszych odruchów ustno-twarzowych i czas,

w którym mogą, a nawet powinny być obecne w życiu dziecka

TABELA: Zaczerpnięta z publikacji naukowej dr Anny Regner 'Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody R. Castillo Moralesa' - zmodyfikowane zestawienie odruchów ustno-twarzowych wg Flehmiga

Odruch	Odpowiedź poprawna	Okres fizjologicznego występowania	Objaw patologiczny
Odruch Babkina	Otwarcie ust	do 4 tyg.	Po 6 tyg.
Odruch otwierania ust	Otwiera usta do	Od urodzenia do 4 m.ż.	
Odruch ssania	Wywołane są ruchy ssania	Od 3 m.ż płodowego rozpoczynają się ruchy ssące	Brak ssania
Odruch połykania	Połykanie: – napięcie ust – nacisk języka ku przodowi	Od urodzenia	
Odruch szukania (z warg i kącików ust)	Obrót głowy w kierunku bodźca	Do 3 m.ż.	Po 6 m.ż.
Odruch zwracania	Odchylenie głowy ku tyłowi, rozszerzenie szczęk, mięśnie języka i gardła kurczą się	Od urodzenia	Brak reakcji
Odruch kąsania	Zaciśnięcie szczęk i trwanie do ustania bodźca	Od urodzenia do 4 m. ż. czasem 7 m. .ż.	Zanika przy pojawieniu się odruch żucia
Odruch żucia	Ruchy żujące	Od 4 m. ż. (7 m. ż.)	Brak reakcji
Odruch żuchwowy	Żuchwa podnosi się wskutek podciągania mięśni żwaczy	Od urodzenia i zmniejsza się	Brak reakcji
Odruch akustyczno-twarzowy	Odruchowe mruganie	Od 10 dni do końca życia	Brak reakcji słuchowej po 3 m.ż.
Odruch optyczno-twarzowy	Odruchowe mruganie	Od 3 m. ż. do końca życia	Brak reakcji po 5 m.ż.